

DEPOSICIÓN FRESCA (I-018)

Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de Deposición Fresca. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un frasco limpio y seco con una paleta de madera.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes.
- Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - ❖ Si el examen solicitado es Clostridium idealmente la deposición debe ser líquida.
 - ❖ Si el examen solicitado es Detección de antígenos de Helicobacter pylori, se recomienda esperar mínimo 4 semanas para realizar el examen en pacientes que hayan recibido tratamiento de erradicación de H. pylori
 - ❖ Si el examen solicitado corresponde a Calprotectina no tomar Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en las últimas 24 horas.

Recolección de la(s) muestra(s):

- Defecar en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
- Con la paleta de madera **tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez**. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y deposítela en el frasco que se le entregó.
- Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales o Clostridium Difficile, **obtenga la muestra de la deposición del área con sangre o mucosidad**.
- Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

- Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:
 - ❖ La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas, Aceites o talco.
 - ❖ Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. **Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas** y colóquela en el frasco que se le entregó.
 - ❖ Si el examen solicitado es leucocitos fecales obtenga la muestra de la deposición del área con **sangre o mucosidad**.
 - ❖ Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Traslado de la muestra:

- Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego introdúzcala dentro de otra bolsa y ciérrela.
- **Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestras antes de que pase una hora desde su emisión.**
- Si son muestras seriadas, puede traerlas juntas. En este caso debe mantenerlas **Refrigeradas**.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos al fono 55-2468152 - 55-2468100